



## A kemoterápia hozzájárul a rákos halálozások negyedéhez: tanulmány

**ABC NEWS, 2008. November 13.**

Egy új tanulmány komoly kérdéseket vetett fel a kemoterápia alkalmazásával kapcsolatban a késői stádiumban lévő rákos betegeknél.

600 rákos beteg esetének a felülvizsgálata Britanniában, akik a kezelés megkezdését követő 30 napon belül meghaltak, azt találta, hogy négyből egy halálesetet a kemoterápia okozott vagy pedig meggyorsította azt.

A kemoterápia egy elfogadott kezelése a ráknak, de a tanulmány megkérdőjelezi, hogy a súlyos betegek meg tudnak-e vele bírkozni.

A tanulmányt a *Betegek Túlélésének és Halálozásainak Nemzeti Bizalmas Kivizsgálása* készítette. A kivizsgálás elvégzésére főleg a brit királyi orvosi főiskolákból kértek fel tagokat.

A tanulmány leginkább azoknak a betegeknek az esetét vizsgálta felül, akik a kemoterápiát palliatív kezelésként kapták, hogy enyhítsék a rák tüneteit – ahol a gyógyulás esélyét már kizárták.

A jelentés szerint 40 százalékuknak súlyos mérgezése lett a kezelés következtében.

„Úgy gondolom, hogy az óvatosság mindig szükségszerű, és nagyon fontos, hogy a betegeket teljes mértékben felvilágosítsák a kezelés veszélyeiről és a lehetséges előnyeiről is,” nyilatkozta Dr. Morse. „De a nap végén, a beteg dönti el, hogy elfogadja-e a kemoterápiát vagy nem.”

A tanulmány megkérdezte, hogy a betegek kaptak-e elég információt a kezelésről. Dr Diane Morse szerint ötből egy esetben a kemoterápia alkalmazása nem a megfelelő döntés volt.

„Azon estekben tűnt úgy, hogy ez nem volt a megfelelő döntés, ahol a betegek életminősége jobb lehetett volna a kezelés nélkül,” nyilatkozta. „Ezek olyan betegek voltak, akik nagyon közel jártak az életük végéhez, és valószínűleg a kemoterápia nem volt előnyös számukra.”

Professor Jim Bishop, az *Új-Dél-Wales-i Rákkutató Intézet* vezérigazgatója, azt nyilatkozta, hogy Ausztráliában a rák túlélésének aránya sokkal jobb, mint az Egyesült Királyságban. De azt is megemlíti, hogy a tanulmány fontos kérdéseket vet fel az itteni orvosok számára is. „Ami igazából fontos, az nem annyira az óvatosság, hanem, hogy mit mutat a bizonyíték,”- mondja Professor Bishop. „Van-e megfelelő bizonyíték arra, hogy a beavatkozás ebben a szakaszban javít a dolgokon, hogy javítani tudjuk a tüneteket, vagy valójában nincs rá bizonyíték, hogy ez javítaná a betegek közérzetét? Ebben az esetben ezt teljes mértékben meg kell beszélni a beteggel és bevonni őt a döntéshozatalba.”

A Rák Bizottság vezérigazgatója, Professor Ian Olver szerint, habár a kemoterápia néha a legjobb módja a rák tüneteinek enyhítésére, néhány beteg nem biztos, hogy teljesen tisztában van ennek a határaival. „Úgy gondolom, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ne hangsúlyozzuk túl az előnyöket, vagy, hogy a beteg ne gondolja azt, hogy ez többet fog használni, mint amit valójában használni tud”-nyilatkozta.

Sara Everingham AM riportja alapján

**Fordítás: Hajnalka Váradi**

**Forrás: [www.LearningGNM.com](http://www.LearningGNM.com)**